

บทที่ 2

เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายงานจากการศึกษาของแพทย์และพิมพ์งานที่ได้ทำการผ่าตัดบริเวณกระดูกด้านคอเพื่อตัดการกดทับของรากประสาท แล้วเกิดขันตรายต่อเส้นเลือด vertebral artery ซึ่งมีรายงานจากหลายประเทศ และ มีรายงานการศึกษาจุดเริ่มต้นของเส้นเลือด vertebral artery ส่วน V, ที่เริ่มผ่านเข้าไปในรูของ transverse foramen จากต่างประเทศโดยมีการศึกษาที่แตกต่างกันไปดังนี้

2.1 เส้นเลือด vertebral artery ได้รับอันตรายขณะผ่าตัด

จากรายงานการผ่าตัดผู้ป่วยที่ประเทศไทยสหราชอาณาจักร ผู้ป่วยชายอายุ 47 ปี มีอาการอ่อนแรงของแขน ขา จากหินปูนเกาะเส้นเอ็น posterior longitudinal ligament แล้วไปกดทับ ไขสันหลัง ขณะทำการผ่าตัดเอาหินปูนออก เส้นเลือด vertebral artery มีการนิ่งขาด และได้ทำการซ่อนแซนหลังผ่าตัด 3 วัน เกิดก้อนเลือด (hematoma) ขึ้นบริเวณผ่าตัด ผู้ป่วยถูกนำเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อซ่อนแซนเส้นเลือดและ นำก้อนเลือดนั้นออกมานา (De los Reyes et al., 1990.)

มีรายงานผู้ป่วยที่ประเทศไทยเยอร์นัน ผู้ป่วยจำนวน 2 ราย เส้นเลือด vertebral artery นิ่งขาดจากการได้รับผ่าตัดผ่านทางด้านหน้าของลำคอ (anterior approach) ผู้ป่วยรายแรกได้รับการผ่าตัดกระดูกด้านคอเพื่อรักษาการตีบแคบของทางผ่านรากประสาท (intervertebral foramen) หลังผ่าตัด 2 วัน มีก้อนเลือด (hematoma) เกิดขึ้นที่บริเวณด้านคอ เนื่องจากเส้นเลือดได้รับอันตราย ผู้ป่วยถูกนำเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อซ่อนแซนเส้นเลือดและนำก้อนเลือดออกมานา ผู้ป่วยรายที่ 2 เกิดจากการผ่าตัดไส้เหล็กยึดกระดูกด้านคอที่ระดับ C2 หลังผ่าตัด 4 วันพบว่ามีก้อนเลือดเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นเลือด ได้รับอันตราย (Daentzer et al., 2003.)

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ผู้ป่วยกระดูกสันหลัง Minnesota (Minnesota spine centre) พบปัญหาในผู้ป่วยจำนวน 10 ราย โดยผู้ป่วย 4 รายมีอาการของกระดูกด้านคอเสื่อมเกิดการกดทับรากประสาท ผู้ป่วย 2 ราย เป็นเนื้องอกที่บริเวณด้านคอ ผู้ป่วย 1 รายมีหินปูนเกาะที่เส้นเอ็น (ossification of the posterior longitudinal ligament) มีกระดูกหัก 2 รายและกระดูกติดเชื้อ 1 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีเปิดเข้าทางด้านหน้าด้านคอ (anterior approach) หลังการผ่าตัดพบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย มีปัญหาทางระบบประสาทจากการขาดเลือดของเส้นเลือด vertebral artery ผู้ป่วย 2 รายมีก้อนเลือดเกิดขึ้นที่บริเวณผ่าตัด ผู้ป่วย 3 ราย เกิดลิ่มเลือดอุดตันผู้รายงาน

เสนอแนะว่า ศัลยแพทย์ควรศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นเลือด vertebral artery และความสัมพันธ์กับโครงสร้างต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายต่อเส้นเลือดนี้ (Smith et al., 1993.)

นิการศึกษาแบบข้อมูลหลังที่ประเทกญี่ปุ่น โดยศึกษาร้อยละของการเกิดอันตรายต่อเส้นเลือด vertebral artery ขณะที่ทำการผ่าตัดกระดูกด้านคอ โดยส่วนแบบสอบถามไปยังกลุ่มของศัลยแพทย์เฉพาะทาง spine surgeon จำนวน 8 กลุ่ม และกลุ่มแพทย์ กระดูกและข้อทั่วไป (general orthopedist) ของโรงพยาบาลต่างๆ พบว่าอันตรายที่เกิดกับเส้นเลือดขณะผ่าตัดเกิดขึ้นร้อยละ 0.14 (8 รายจาก 5,641 ราย) ซึ่งมีสาเหตุจากการผ่าตัดกระดูกด้านคอที่เปิดเข้าทางด้านหน้า (Neo et al., 2008) มีการศึกษาที่ประเทกษาหรือรัฐอเมริกาซึ่งได้ข้อมูลจาก ศัลยแพทย์เฉพาะทาง spine surgeon จำนวน 10 ท่าน พบว่าอันตรายที่เกิดกับเส้นเลือดในร้อยละผ่าตัดเกิดขึ้นร้อยละ 0.3 (6 รายจาก 1,976 ราย) ซึ่งมีสาเหตุจากการผ่าตัดกระดูกด้านคอที่เปิดเข้าทางด้านหน้า เช่นกัน (Burke et al., 2005) มีการศึกษาระยะเวลาห่างระหว่าง uncinate process และ foramen transversarium ที่ภายในมี vertebral artery บรรจุอยู่ พบว่าที่ระดับ C3-C6 มีความยาวจาก 1.4-2.2 มิลลิเมตร (Ebraheim et al., 1997) ดังนั้นถ้ามีการผ่าตัดบริเวณ uncinate process อาจทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดนี้ได้

จากรายงานอันตรายที่เกิดขึ้นกับเส้นเลือด vertebral artery ขณะผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าขยะผ่าตัดควรระวังเรื่องของ ความแปรปรวนของเส้นเลือดซึ่งจะทำให้เกิดความเสื่อมมากขึ้น รวมทั้งขยะใส่ screws (transarticular screws and pedicle screws) เพื่อยืดโครงสร้างหรือขยะที่กำลังกรอกกระดูก (posterior drilling) ดังนั้นก่อนผ่าตัดควรมีการทำ MRI หรือ CT scan ก่อน (Peng et al., 2009)

2.2 อันตรายต่อเส้นเลือด vertebral artery จากสาเหตุต่างๆ

มีรายงานอาการของผู้ป่วยจากการที่เส้นเลือด vertebral artery ถูกทำลายในผู้ป่วยจำนวน 23 ราย เส้นเลือดได้รับอันตรายจากการถูกขึง ถูกแทง และถูกกระแทก พบว่าผู้ป่วย 12 ราย เส้นเลือด vertebral artery มีการอุดตัน (thrombosis) ผู้ป่วย 7 ราย เส้นเลือดเป็นรูทะลุ และอีก 4 รายไม่มีการอุดตันของเส้นเลือด อาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย 6 ราย มีอาการทางระบบประสาทซึ่งผู้ป่วย 5 รายนี้ อาการของระบบประสาทส่วนกลางโดยเสียชีวิต 4 ราย และอีก 1 รายมีอาการขาดเลือดจาก vertebral artery ถูกอุดตัน (Golueke et al., 1987.) มีการรวบรวมข้อมูลแบบข้อมูลหลังในผู้ป่วยที่กระดูกด้านคอแตก(fracture) และเกิดอันตรายต่อเส้นเลือด vertebral artery ด้วยวิธีการทำ MRI พบว่าในผู้ป่วยจำนวน 6 ราย เส้นเลือด vertebral artery มีการอุดตันแบบ unilateral โดยผู้ป่วยรายนี้ อาการของการขาดเลือดจากหลอดเลือดนี้ (vertebrobasilar insufficiency) (Veras et al., 2000) มี

รายงานกรณีศึกษาจากประเทสหรรรอมเบริกา พบผู้ป่วยหญิงอายุ 59 ปีเส้นเลือด vertebral artery ข้างซ้ายได้รับอันตรายขณะทำการตัดหมอนรองกระดูกด้านคอ และใช้ screw ขิดกระดูกด้านคอตั้งแต่ระดับ C3-C7 หลังผ่าตัดพบมีเส้นเลือด vertebral artery โป่งพอง และมีลิมมเลือด(embolism) และผู้ป่วยมีอาการลืนลำบาก แพทย์ได้ทำ MRI พบร้าเส้นเลือด vertebral artery มีความผิดปกติทั้งสองข้าง แพทย์ผู้ผ่าตัดได้ให้ข้อแนะนำว่าทิมงานแพทย์ผ่าตัดควรระวังเรื่องของความแปรปรวนของเส้นเลือด vertebral artery ให้มากๆ (Gantwerker et al., 2010)

2.3 ระดับของกระดูกด้านคอที่ส่วน V₂ ของ vertebral artery เริ่มผ่านเข้าไปใน transverse foramen

มีการศึกษาที่ประเทสฟรั่งเศส ศึกษาความแปรปรวนของส่วน V₂ ของเส้นเลือด vertebral artery จำนวน 500 เส้น ในผู้ป่วย 250 คน โดยศึกษาด้วยวิธีการทำ MRI และ CT scans พบร้าส่วน V₂ เริ่มเข้าสู่ transverse foramen ที่ระดับ C6 มากที่สุด (93%) รองลงมาคือ C5 (5%), C4 (1%), C7 (0.8%) และ C3 (0.2%) ตามลำดับ และพบรูของ transverse foramen ที่มีเส้นเลือด vertebral artery ผ่านเข้าไปมีขนาดใหญ่กว่ารูที่ไม่มี เส้นเลือด vertebral artery ผ่านเข้าไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Bruneau et al., 2006)

มีการศึกษาที่ประเทสครุกี จากร่างที่ยังไม่ผ่านน้ำนมารักษาสภาพ จำนวน 30 ร่าง พบร้าส่วนของ V₂ เริ่มเข้าสู่ transverse foramen ที่ระดับ C6 (90%) C7 (7%) และ C4 (3 %) ตามลำดับและยังพบร้า รูของ transverse foramen ที่มีเส้นเลือด vertebral artery ผ่านเข้าไปมีขนาดใหญ่กว่ารูที่ไม่มี เส้นเลือด vertebral artery ผ่านเข้าไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน (Civelek et al., 2007) ที่ประเทสกาฬีศึกษาจากผู้ป่วยจำนวน 350 ราย ด้วยวิธี CT scans พบร้าส่วน V₂ เริ่มเข้าสู่ transverse foramen ที่ระดับ C6 (94.9%), C5 (3.3%), C4 (1.6%) และ C7 (0.3%) (Hong et al., 2008.)

เนื่องจากการศึกษาของ Civelek et al., 2007 มีการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำกัด ไม่มีความแตกต่างจากการศึกษาของ Bruneau et al., 2006 และการศึกษาของ Hong et al., 2008. ซึ่งศึกษาจาก MRI และ CT scan ดังนั้นการศึกษารั้งนี้จึงต้องการศึกษาระดับของกระดูกด้านคอ ที่ส่วน V₂ ของ vertebral artery เริ่มผ่านเข้าไปใน transverse foramen ในคนไทย โดยการศึกษาจากโครงกระดูกด้านคอ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ประยัดงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับการทำ MRI สามารถเก็บข้อมูลได้จำกัด สะดวก และได้กลุ่มตัวอย่างมากพอต่อความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องการศึกษาความแตกต่างของความแปรปรวนของ หลอดเลือด vertebral artery ส่วน V₂ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง และความแตกต่างระหว่างข้างซ้ายและขวา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนผ่าตัดไป